

SÜT SIĞIRCILIĞININ OLMAZSA OLMAZ KURALI
DENGELİ VE BİLİNÇLİ BESLENME
KABA YEMİ KENDİN
YAPACAKSIN.

BESLENME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTALAR

1-KURU MADDE,ELYAF,SU,ENERJİ VE PROTEİN HAYVANIN BAŞLICA İHTİYAÇ DUYDUĞU ÖĞELERDİR.

2-RASYONDAKİ TUZ,MİNERAL (KALSIYUM ,FOSFOR) , İZMİNERALLER VE VİTAMİNLERİN (A ,D ve E) MİKTARI KONTROL EDİLMELİDİR.

3-GÜNLÜK KESİF YEM MİKTARI HAYVAN VÜCÜT AĞIRLIĞININ %2-3'ÜNÜ GEÇMEMELİ,%1,5 UN ALTINDA KALMAMALIDIR.

4-VİTAMİNLER VÜCÜTTA SENTEZLENMEDİĞİ İÇİN MUTLAKA DIŞARDA VERİLMELİDİR.

5-SAĞMAL İNEKLERE MISIR SİLAJI,OT SİLAJI,
KURU YONCA,İYİ KALİTEDE KURU OT VE HUBUBAT
HASILI GİBİ YEMLERDEN DOYASIYA
VEREBİLİYORSAK KESİF YEMDEN BÜYÜK ÖLÇÜDE
TASARRUF SAĞLAR VE BÖYLECE BESLENME
MALİYETLERİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜŞÜREBİLİRİZ.

YEM MADDELERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ

A-KABA YEM

- ELYAF BAKIMINDAN ZENGİNDİR
- SİNDİRİM SİSTEMİNİN DÜZENLİ ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİDİR.
- KALİTESİ ARTTIKÇA KESİF YEME OLAN İHTİYAÇ AZALIR.
- SAMANLAR, HASAT VE HARMAN ARTIKLARI, OT VE HASILLAR, FABRİKASYON ARTIKLARI VE SİLAJLAR KABA YEM İÇİN UYGUNDUR.

KALİTEYİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER

1-BESİN DEĞERİ VE MALİYETİ: MISIR SULU TARIM İÇİN UYGUNDUR.DANELER SÜT OLGUNLUĞUNA ERİŞTİĞİNDE BIÇILEREK YAPILDIĞINDA 1 DÖNÜM TARLADAN 6-7 TON HASIL ELDE EDİLİR VE BU DA İNEĞİN 6-7 AYLIK İHTİYACINI KARŞILAR.BUNUNLA BERABER %40 ARPA,%30 YULAF VE %30FIĞ KARIŞIMI DA EN AZ MISIR KADAR BESİN DEĞERİ YÜKSEK VE EKONOMİK BİR KABA YEM KARIŞIMIDIR.

2-BİTKİNİN TÜRÜ : YONCA,KORUNGA VE BAKLIYAT TÜRÜNDEN BÜTÜN YABANI VE KÜLTÜR BİTKİLERİ, TIRTIL VE ÇAYIR OTLARI HASIL HALİNDEKİ HUBUBAT TÜRLERİ,KÖK BİTKİLERİNDEN HAYVAN PANCARI VE YEMLİK KOLZA EN İYİ KALİTEDE YEM BİTKİSİ TÜRLERİDİR.

3-GELİŞME EVRELERİ: ÇİÇEKLENME ÖNCESİNDE HASAT EDİLENLERDE KURU MADDE VE ELYAF BAKIMINDAN FAKİR ,PROTEİN BAKIMINDAN ZENGİN VE SİNDİRİLEBİLİRLİĞİ KOLAYDIR.

4-HASAT, TAŞIMA VE KURUTMA : GÖLGEDE
KURUTULANLARA GÖRE GÜNEŞTE KURUTULANLARIN
VİTAMİN SEVİYESİ DAHA DÜŞÜKTÜR.

5-DEPOLAMA KOŞULLARI: KURUTULMUŞ KABA YEM UZUN
SÜRE BEKLETİLMEMELİDİR. BESİN KAYBINA NEDEN
OLUR. DEPO RUTUBETSİZ VE HAVADAR OLMALIDIR.

6-BESİN DEĞERİNİ ARTTIRMA VE KORUMA:
DEPOLANMASINI VE SİNDİRİLEBİLİRLİĞİNİ
KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN SİLAJLAMA YAPILIR.

7-KABA YEMİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: YEMİN
KOKUSU, TADI VE LEZZETİ HAYVAN İÇİN ÇEKİCİ
OLMALIDIR. İNCE KIYILMIŞ OLMAMALI VE 1,5-2 CM'DEN
UZUN KIYIMLAR TERCİH EDİLMELİDİR. ODUNLAŞMIŞ
SERT KISIMLAR MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ OLMALIDIR.

B-KESİF YEM

- ENERJİ,PROTEİN, MİNERAL,İZ MİNERAL VE VİTAMİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ YEM KARIŞIMIDIR.
- KABA ELYAF BAKIMINDAN FAKİR,ENERJİ VE PROTEİN BAKIMINDAN ZENGİN OLAN YEMLERDİR.
- ENERJİ AĞIRLIKLI MISIR,ARPA,BUĞDAY,ÇAVDAR ,SORGUN,KEPEK,KIRIK BUĞDAY,MELAS VE PANCAR POSASI,PROTEİN AĞIRLIKLI PAMUK,AYÇİÇEĞİ,SOYA ,SUSAM,HAŞHAŞ,ASPIR KÜSPESİ GİBİ YAĞLI TOHUMLARDIR KULLANILMAKTADIR.

DİKKATLİ YEDİRİLMESİ GEREKEN YEM MADDELERİ

- CİNSİ NE OLURSA OLSUN YETERLİ KABA YEM VERİLMİYORSA HİÇBİR KESİF YEM ALABİLDİĞİNE YEDİRİLMEMELİDİR.
- HUBUBAT, ŞEKERLİ, UNLU VE KARMA YEMLER BİRDEN BİRE ALIŞILMADIK ŞEKİLDE VERİLMEMELİDİR. (HAZIMSIZLIK, İŞKEMBEDE ŞİŞLİK, SÜT VERİMİNDE VE YAĞINDA DÜŞME)
- KESİF YEM EN FAZLA 2 HAFTALIK İHTİYACA YETECEK KADAR ALINMALIDIR.

• HAYVANA BAHAR AYLARINDA MERAYA ÇIKARILMADAN ÖNCE YADA AKŞAM DÖNÜNCE KABA YEM TAKVİYESİ YAPILMALI VE KESİF YEM MİKTARI AZALTILMALIDIR.

• İYİ GÜBRELENMEMİŞ TARLADAN HASAT EDİLEN KÖRPE BİTKİLER VERİLMEMELİDİR.

• MELAS HAYVAN BAŞINA GÜNDE EN FAZLA 0.5 KG VERİLMELİDİR.

• PANCAR YAPRAĞI FAZLA YEDİRİLMEMELİDİR. HASAT ZAMANI HAYVANLAR YARI TOK TARLAYA YOLLANMALIDIR.

•ÇİMLENMİŞ PATATES VE BOZULMUŞ PATATES POSASI ZEHİRLİDİR.

•KANYAŞ VE SUDAN OTU GİBİ BİTKİLER ÇİÇEKTEN ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ZEHİRLİDİR.

•FAZLA YEDİRİLEN SOĞAN,LAHANA,KARALAHANA YAPRAKLARI KANLI GÖRÜNÜTE İDRARA NEDEN OLURLAR

•MEŞE YAPRAĞI,EĞRELTİ OTU VE KÖPEK LAHANASI BÖBREK BOZUKLUKLARINA NEDEN OLUR.

•ÇİĞİT KAPÇIĞI,TEK BAŞINA UZUN ZAMAN VERİLDİĞİNDE MİDE RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUR,KABA YEM İLE BERABER VERİLMELİDİR.

•BURÇAK,BAKLA,ACI BAKLA VE DİĞER BAKLAGİL TOHUMLARI ÇOK FAZLA VE SÜREKLİ YEDİRİLİRSE,SÜT VERİMİNİ OLUMSUZ ETKİLER, KIZGINLIK DÜZENSİZLİKLERİNE VE DÖL TUTMA PROBLEMLERİNE NEDEN OLUR.

•HUBUBAT SİLOLARINDA BOZULAN HUBUBATI HAYVANA YEDİRMEK RİSKLİDİR.

•ELEK ALTI,DEĞİRMEN ALTI KIRIK BUĞDAYLARIN İÇİNDE YABANI OT BULUNDUĞUNDAN RASYONDA %5'DEN FAZLA VERİLMEMELİDİR.

•ÇELTİK KAVUZU HAYVAN YEMİ OLARAK BİRŞEY İFADE ETMEZ.SİNDİRİLME ORANI DÜŞÜKTÜR.

- HAYVANLARIN ÇÖPLÜK VE ÇEVRE KİRLENMESİNİN OLDUĞU YERLEDE OTLAMAMASI GEREKMEKTEDİR.
- MUTFAK, FIRIN VE SOFRA ARTIKLARI HAYVANA YEDİRİLMEMELİDİR.
- KÜFLENMİŞ YEMLER TEDAVİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SİNİR BOZUKLUKLARINA NEDEN OLMAKTADIR.
- STERİLİZE EDİLMEMİŞ VEYA SİLAJLANMAMIŞ TAVUK GÜBRESİ SAKINCALIDIR.

YEMLERİN DEPOLANMASINDA DİKKAT EDİLEMESİ GEREKENLER

1-KABA YEMLER TAZE OLARAK YEDİRİLMELİ YADA NEM ORANI %14'ÜN ALTINA DÜŞECEK ŞEKİLDE KURUTULMALI,RUTUBETSİZ VE HAVADAR BİR DEPODA BALLYALAR HALİNDE YADA YANLARDAN HAVA ALACAK ŞEKİLDE ÇATI ŞEKLİNDE MUHAFA EDİLMELİDİR.

2-KABA YEM SİLAJ TARZINDA DEPOLANMALIDIR.

3-YEM AMBARLARININ AHIRIN DIŐINDA VE HAYVANLARDAN TAMAMEN AYRI YERLERDE BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.BU ALANLAR SERİN VE HAVADAR OLMALIDIR.

4-TABANI TOPRAK SEVİYESİNDEN YÜKSEKTE OLMALI,GÜNEŐ VE RUTUBET ALMAMALIDIR.

5-DÖKME YEMLER ÇABUK BOZULDUKLARI İÇİN ÇUVAL İLE SAKLANMALI YADA SİLOLARDA MUHAFAZA EDİLMELİDİR.

SONUÇ

- ÖNCELİKLE HAYVANLARI SEVMELİ AYRI BİR İŞ OLARAK BENİMSENMELİDİR
- İYİ CİNS HAYVANLA
- UYGUN BARINAKLARDA
- DOĞRU BAKIM VE BESLENME İLE
- İŞLETMESİNİ BİLİNÇLİ İDARE EDEN YETİŞTİRİCİLERLE

**KARLI BİR HAYVANCILIK
YAPMAK HER ZAMAN
MÜMKÜNDÜR.**